

REGISTRO PARTICELLARE

Particella assestamentale n. :	01	Sottoparticella:	-
Compresa:	- B - boschi degradati	Attitudine:	protezione
Località:	Demanio: Conocchia - loc. "Croce della Conocchia"		
Superficie totale, ha:	102,1	Sup. boscata, ha:	25,7
		Pascoli/incolti, ha :	75,1
		Altra sup., ha:	1,3
Confini fisiografici della particella			
Nord:	Limite amministrativo	Sud:	sentiero
Est:	Vallone	Ovest:	Limite amministrativo
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	950		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	44,7%
Descrizione:	Aree costituite in prevalenza da zone pascolive ed incolti (da cui deriva il nome della località "erbatenera"), suolo poco profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti, Nell'area meridionale insistono formazioni di origine artificiale realizzate a partire dall'anno 1934 mediante rimboschimenti eseguiti con pino d'aleppo, pino marittimo, cipresso e pino nero nonché con la semina di leccio. Il soprassuolo derivato è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere e latifoglie derivanti anche dalla diffusione naturale negli impluvi e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. L'area è stata interessata dagli incendi dell'estate 2012 con il danneggiamento di quasi il 50% della superficie boscata.		
Specie prevalenti:	Leccio, conifere	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60-70	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 01 - 53		

Particella assestamentale n. :	02	Sottoparticella:	-
Compresa:	- A - boschi di protezione	Attitudine:	protezione
Località:	Demanio: Conocchia - loc. "Monte di Mezzo"		
Superficie totale, ha:	39,3	Sup. boscata, ha:	17,4
		Pascoli/incolti, ha :	21,0
		Altra sup., ha:	0,9
Confini fisiografici della particella			
Nord:	Limite amministrativo	Sud:	Vallone
Est:	Vallone	Ovest:	Vallone
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	1.070		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	50,0%
Descrizione:	Aree costituite in prevalenza da incolti, suolo poco profondo con rilevati rocciosi affioranti, Il soprassuolo è costituito da formazioni alquanto degradate con prevalenza di carpino, leccio, orniello e roverella . L'area è stata interessata da un significativo fenomeno franoso censito nell'inventario della competente AdB.		
Specie prevalenti:	Carpino, orniello, roverella	Area basimetrica media per ha (mq.):	17,47
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	16
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 01 - 02 - 59 - 61		

Particella assestamentale n. :	03	Sottoparticella:	-
Compresa:	- B - boschi degradati	Attitudine:	boschi di protezione
Località:	Demanio: Conocchia - loc. "Carpenna"		
Superficie totale, ha:	49,1	Sup. boscata, ha:	35,1
		Pascoli/incolti, ha :	12,7
		Altra sup., ha:	1,2
Confini fisiografici della particella			
Nord:	sentiero	Sud:	sentiero - impluvio
Est:	sentiero	Ovest:	sentiero - Limite amministrativo
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	690		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	44,5%
Descrizione:	Nella particella insistono formazioni di origine artificiale realizzate a partire dall'anno 1934 mediante rimboschimenti eseguiti con pino d'aleppo, pino marittimo, cipresso e pino nero nonché con la semina di leccio. Il soprassuolo derivato è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere e latifoglie derivanti anche dalla diffusione naturale negli impluvi e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. Suolo poco profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti, L'area è stata interessata dagli incendi dell'estate 2012 che hanno interessato tutta la superficie boscata.		
Specie prevalenti:	leccio, conifere	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60-70	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 20 - 22 - 23		

Particella assestamentale n. :	04	Sottoparticella:	-
Compresa:	- B - boschi degradati	Attitudine:	boschi di protezione
Località:	Demanio: Conocchia - loc. "Caserma Forestale"		
Superficie totale, ha:	11,6	Sup. boscata, ha:	7,4
		Pascoli/incolti, ha :	3,4
		Altra sup., ha:	0,8
Confini fisiografici della particella			
Nord:	vallone - sentiero	Sud:	strada carrabile - propr. private
Est:	vallone	Ovest:	vallone - contrafforti rocciosi
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	470		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	52,4%
Descrizione:	Il soprassuolo, è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere, derivanti dall'impianto eseguito a partire dal 1934, e latifoglie (leccio, orniello) derivanti anche dalla diffusione naturale; negli impluvi e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. Suolo poco profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti. L'area è stata interessata dagli incendi dell'estate 2012 che hanno interessato tutta la superficie boscata.		
Specie prevalenti:	leccio - conifere	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60-70	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 14 - 20; Fol. : 06 - part. : 02 - 06		

Particella assestamentale n. :	05	Sottoparticella:	-
Compresa:	- A - boschi di protezione	Attitudine:	protezione
Località:	Demanio: Conocchia - loc. "Caserma Forestale"		
Superficie totale, ha:	16,0	Sup. boscata, ha:	14,4
		Pascoli/incolti, ha :	1,3
		Altra sup., ha:	0,3
Confini fisiografici della particella			
Nord:	sentiero	Sud:	contrafforti rocciosi
Est:	vallone	Ovest:	contrafforti rocciosi
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	650		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	44,4%
Descrizione:	Il soprassuolo, è costituito da formazioni irregolari consociate dove coesistono conifere, derivanti dall'impianto eseguito a partire dal 1934, e latifoglie (leccio, orniello) derivanti anche dalla diffusione naturale; negli impluvi e nelle aree più fresche con uno strato di terreno maggiore sono presenti ontano, carpino nero. Suolo poco profondo con frequenti rilevati rocciosi affioranti.		
Specie prevalenti:	leccio - conifere	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60-70	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 53 - 54		

Particella assestamentale n. :	06	Sottoparticella:	-
Compresa:	- C - cedui misti invecchiati	Attitudine:	cedui in conversione
Località:	Demanio: Campo dei galli - loc. "Vallone Grarelle"		
Superficie totale, ha:	28,7	Sup. boscata, ha:	22,3
		Pascoli/incolti, ha :	5,8
		Altra sup., ha:	0,6
Confini fisiografici della particella			
Nord:	vallone	Sud:	sentiero
Est:	vallone	Ovest:	vallone
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	930		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	43,5%
Descrizione:	Ceduo invecchiato costituito da ontano, orniello, carpino nero, leccio acero ed altre latifoglie. Suolo poco profondo a tratti roccioso.		
Specie prevalenti:	ontano, orniello, carpino, leccio	Area basimetrica media per ha (mq.):	35,89
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	17
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 02 - 61		

Particella assestamentale n. :	07	Sottoparticella:	-
Compresa:	- C - cedui misti invecchiati	Attitudine:	cedui in conversione
Località:	Demanio: Campo dei galli - loc. "Campo dei galli"		
Superficie totale, ha:	28,3	Sup. boscata, ha:	22,1
		Pascoli/incolti, ha :	5,5
		Altra sup., ha:	0,7
Confini fisiografici della particella			
Nord:	sentiero	Sud:	vallone - contrafforti rocciosi
Est:	contrafforti rocciosi	Ovest:	vallone
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	730		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	46,8%
Descrizione:	Ceduo invecchiato costituito da leccio, omiello, roverella ed altre latifoglie della macchia mediterranea. Suolo poco profondo a tratti roccioso con rilevati rocciosi.		
Specie prevalenti:	leccio, roverella, omiello	Area basimetrica media per ha (mq.):	32,32
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	9
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 61 - 79		

Particella assestamentale n. :	08	Sottoparticella:	-
Compresa:	- C - cedui misti invecchiati	Attitudine:	cedui in conversione
Località:	Demanio: Porto" - loc. "Vallone Porto"		
Superficie totale, ha:	10,2	Sup. boscata, ha:	9,1
		Pascoli/incolti, ha :	0,6
		Altra sup., ha:	0,5
Confini fisiografici della particella			
Nord:	strada comunale - ril. rocciosi	Sud:	propr. private
Est:	rilevati rocciosi	Ovest:	rilevati rocciosi
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	180		
Esposizione prevalente:	SW	Pendenza media:	49,6%
Descrizione:	Ceduo invecchiato costituito da leccio, carpino, orniello, roverella ed altre latifoglie. Area impluviale con presenza di rilevati rocciosi.		
Specie prevalenti:	leccio, carpino, orniello	Area basimetrica media per ha (mq.):	29,11
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	14
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa e specifiche per la particella,		
Inquadramento catastale:	Fol. : 01 - part.: 15 - 78; Fol. : 07 - part. : 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 44 - 243		

Particella assestamentale n. :	09	Sottoparticella:	-
Compresa:	- C - cedui misti invecchiati	Attitudine:	cedui in conversione
Località:	Demanio: Capriglione - loc. "Laurito"		
Superficie totale, ha:	8,3	Sup. boscata, ha:	5,6
		Pascoli/incolti, ha :	2,1
		Altra sup., ha:	0,7
Confini fisiografici della particella			
Nord:	rilevati rocciosi	Sud:	vallone
Est:	rilevati rocciosi	Ovest:	rilevati rocciosi
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	210		
Esposizione prevalente:	SW	Pendenza media:	57,6%
Descrizione:	Ceduo invecchiato costituito da leccio, orniello, carpino ed altre latifoglie.		
Specie prevalenti:	leccio, orniello, carpino	Area basimetrica media per ha (mq.):	26,80
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	13
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 08 - part.: 131		

Particella assestamentale n. :	10	Sottoparticella:	-
Compresa:	- C - cedui misti invecchiati	Attitudine:	cedui in conversione
Località:	Demanio: Vene - loc. "Capo di Masina"		
Superficie totale, ha:	28,5	Sup. boscata, ha:	13,5
		Pascoli/incolti, ha :	14,3
		Altra sup., ha:	0,7
Confini fisiografici della particella			
Nord:	vallone	Sud:	rilevati rocciosi
Est:	vallone	Ovest:	rilevati rocciosi
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	540		
Esposizione prevalente:	SE	Pendenza media:	49,9%
Descrizione:	Ceduo invecchiato costituito da carpino, cerro, orniello ed altre latifoglie.		
Specie prevalenti:	carpino, cerro, orniello	Area basimetrica media per ha (mq.):	40,74
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	17
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 02 - part.: 13 - 16 - 17 - 33		

Particella assestamentale n. :	11	Sottoparticella:	-
Compresa:	- A - boschi di protezione	Attitudine:	protezione
Località:	Demanio: Vene - loc. "Pantaniello"		
Superficie totale, ha:	19,1	Sup. boscata, ha:	3,1
		Pascoli/incolti, ha :	15,9
		Altra sup., ha:	0,1
Confini fisiografici della particella			
Nord:	vallone	Sud:	vallone
Est:	vallone	Ovest:	vallone - rilevati rocciosi
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	510		
Esposizione prevalente:	SE	Pendenza media:	51,8%
Descrizione:	Ceduo a tratti degradato con presenza di leccio ed altre latifoglie tipiche della macchia mediterranea. terreno superficiale, roccioso con rilevati affioranti.		
Specie prevalenti:	leccio	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 02 - part.: 16 - 33		

Particella assestamentale n. :	12	Sottoparticella:	-
Compresa:	- A - boschi di protezione	Attitudine:	protezione
Località:	Demanio: Fiossa - loc. "Pantaniello"		
Superficie totale, ha:	9,3	Sup. boscata, ha:	3,2
		Pascoli/incolti, ha :	6,1
		Altra sup., ha:	0,0
Confini fisiografici della particella			
Nord:	rilevati rocciosi	Sud:	sentiero
Est:	vallone	Ovest:	rilevati rocciosi - propr. private
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	330		
Esposizione prevalente:	SE	Pendenza media:	52,2%
Descrizione:	Ceduo a tratti degradato con presenza di leccio ed altre latifoglie tipiche della macchia mediterranea. terreno superficiale, roccioso con rilevati affioranti.		
Specie prevalenti:	leccio	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 02 - part.: 33		

Particella assestamentale n. :	13	Sottoparticella:	-
Compresa:	- D - rimboschimenti	Attitudine:	rimboschimenti
Località:	Demanio: Fiossa - loc. "Pantaniello"		
Superficie totale, ha:	26,5	Sup. boscata, ha:	21,5
		Pascoli/incolti, ha :	4,6
		Altra sup., ha:	0,4
Confini fisiografici della particella			
Nord:	sentiero	Sud:	strada statale
Est:	vallone	Ovest:	vallone
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	260		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	50,4%
Descrizione:	Rimboschimenti con prevalenza di pino d'Aleppo, orniello, roverella ed essenze della macchia mediterranea		
Specie prevalenti:	Pino d'Aleppo, orniello	Area basimetrica media per ha (mq.):	50,85
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	26
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 02 - part.: 33 - 40		

Particella assestamentale n. :	14	Sottoparticella:	a - b
Compresa:	- A - boschi di protezione	Attitudine:	protezione
Località:	Demanio Calcarone - loc. "Pantaniello"		
Superficie totale, ha:	12,6	Sup. boscata, ha:	4,2
		Pascoli/incolti, ha :	5,8
		Altra sup., ha:	2,6
Confini fisiografici della particella			
Nord:	strada statale	Sud:	mar Tirreno
Est:	vallone	Ovest:	propr. private
Altitudine media (mt. s.l.m.) :	80		
Esposizione prevalente:	S	Pendenza media:	56,6%
Descrizione:	Aree comprese tra la statale "Amalfitana" ed il mare. vegetazione costituita per lo più da macchia mediterranea.		
Specie prevalenti:	leccio ed altre	Area basimetrica media per ha (mq.):	n.c.
Età media/stimata:	60	Diametro medio, (cm.):	n.c.
Pianificazione nel decennio:	si rimanda alle prescrizioni di compresa.		
Inquadramento catastale:	Fol. : 02 - part.: 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 36 - 41 - 42 - 45 - 47 - 48; Fol. : 03 - part. : 228		